



CALIPROBOLIE JOLIE

Caliprobola speciosa

Couleur bronze, ailes jaunâtres, front, antennes et longues pattes oranges, abdomen avec des bandes de pilosité dorées.

Observation

J F M A M J J A S O N D

Dans les forêts de feuillus et les vieux boisements. La larve vit dans les racines et les souches des arbres en décomposition.

Taille entre 13 mm
17 mm



⚠ ressemble à une abeille

EPISTROPHE ÉLÉGANTE

Epistrophe eligans

Deux grosses taches jaunes sur le haut de l'abdomen suivies d'une fine bande jaune. Pattes jaunes.

Observation

J F M A M J J A S O N D

Dans les bois de feuillus, parcs et jardins. La larve se nourrit de pucerons.

Taille entre 9 mm
11 mm



⚠ ressemble à une abeille

ERISTALE DES FLEURS

Myathropa florea

Dessin «Batman» sur le dos du thorax et larges taches oranges sur l'abdomen.

Observation

J F M A M J J A S O N D

À la lisière des bois, dans les prairies fleuries, en bordure de chemins, quasi-exclusivement en zones boisées. Les larves vivent dans les cavités humides des arbres.

Taille entre 10 mm
14 mm



⚠ ressemble à une abeille

ERISTALE GLUANTE

Eristalis tenax

Double rangée verticale de poils sur les yeux. Deux grandes taches oranges sur le haut de l'abdomen.

Observation

J F M A M J J A S O N D

En milieux variés, dont les jardins. Les larves aquatiques sont présentes dans les eaux des mares, fossés, purins... très chargées en matières organiques et très pauvres en oxygène. Les femelles passent l'hiver à l'abri.

Taille entre 14 mm
16 mm



FERDINANDE DORÉE

Ferdinande cuprea

Dos du thorax à rayures longitudinales noires et grises, abdomen brillant couleur bronze, ailes avec des nervures centrales assombries.

Observation

J F M A M J J A S O N D

Dans les bois de chênes. Les larves vivent dans le bois en décomposition, les blessures d'arbres et les coulées de sève.

Taille entre 7 mm
13 mm



⚠ ressemble à un frelon

MILÉSIE FAUX-FRELON

Milesia crabroniformis

Deux taches noires séparées par une bande noire sur le dos du thorax. Abdomen jaune et roux, bord des ailes de coloration jaunâtre.

Observation

J F M A M J J A S O N D

Dans les espaces boisés avec de l'eau à proximité. Les larves vivent dans le terreau des cavités d'arbres.

Taille entre 15 mm
27 mm



RHINGIE CHAMPÊTRE

Rhingia campestris

Appareil buccal pointu, abdomen rouge orange, pattes oranges et noires.

Observation

J F M A M J J A S O N D

Dans les prairies pâturées, les lisières de bois, les zones de bocage. Les larves vivent dans les bouses de vaches.

Taille entre 11 mm
14 mm



SYRITTE PIAULANTE

Syritta pipiens

Face et côtés du thorax blancs, pattes arrières zébrées avec fémur très épais.

Observation

J F M A M J J A S O N D

Dans les zones humides et en bord de sites en eaux. Les larves aquatiques vivent dans les matières humides en décomposition, comme la bouse de vache et les tas de compost.

Taille entre 7 mm
9 mm



SYRPHE PORTE-PLUME

Sphaerophoria scripta

Allure svelte, bandes jaunes sur le côté du thorax. Le mâle a l'abdomen qui dépasse largement les ailes.

Observation

J F M A M J J A S O N D

Dans les prairies, les friches, les parcs et les jardins. Les larves consomment des pucerons.

Taille entre 7 mm
12 mm



SYRPHE À CEINTURES

Episyrphus balteatus

Présence de bandes noires en forme de moustaches sur l'abdomen. Attention : dessins variables.

Observation

J F M A M J J A S O N D

Dans des milieux divers. Très commun dans les jardins. Les larves consomment des pucerons.

Taille entre 8 mm
12 mm



⚠ ressemble à un bourdon

VOLUCELLE BOURDON

Volucella bombylans


Trois variétés de coloration, mais le plus souvent une couleur noire avec du orange à l'extrémité de son abdomen.

Observation

J F M A M J J A S O N D

Dans les prairies, aux abords des chemins, en lisière de bois. Les larves vivent dans les nids de bourdons où elles consomment les larves mortes, parfois même vivantes.

Taille entre 11 mm
17 mm



VOLUCELLE ENFLÉE

Volucella inflata

Côtés du thorax orangés. Deux grosses taches jaunes sur fond noir sur le haut de l'abdomen. Tache sombre au milieu des ailes.

Observation

J F M A M J J A S O N D

Dans les forêts de feuillus. Les larves vivent dans les milieux subaquatiques de galeries d'insectes, terreau des cavités d'arbres, écoulements de sève.

Taille entre 12 mm
16 mm



⚠ ressemble à un frelon

VOLUCELLE ZONÉE

Volucella zonaria


Dos du thorax sombre, abdomen avec de larges bandes noires et jaune-orange. Le bord antérieur des ailes est brun-jaune.

Observation

J F M A M J J A S O N D

En lisière de forêt, dans les parcs et les jardins. Les larves sont des parasites des larves de frelons.

Taille entre 18 mm
22 mm



Pollinisateurs des Pays de la Loire

Saurez-vous reconnaître, dans vos jardins, ces mystérieuses mouches colorées souvent confondues avec les guêpes ou les abeilles ?



SÈVRE ET BOCAGE

Avec le soutien financier de :

